

本院 GLP-1 致效劑品項

2025/9/15

成分	Liraglutide		Semaglutide			Dulaglutide	Tirzepatide
商品名	Victoza® (胰妥善)	Saxenda® (善纖達)	Rybelsus® (瑞倍適)	Ozempic® (胰妥讚)	Wegovy® (週纖達)	Trulicity®(易週糖)	Mounjaro® (猛健樂)
仿單 適應症	血糖控制 (10 歲以上第二型 糖尿病患者)	體重控制 (成人或 12 歲以 上肥胖青少年)	血糖控制 (第二型糖尿病成人 患者)	血糖控制 (第二型糖尿病 成人患者)	體重控制 (成人或 12 歲以 上肥胖青少年)	血糖控制 (10 歲以上第二型糖 尿病患者)	血糖控制(第二型糖尿 病成人患者)、體重控 制(成人)
自費價	約 1432-4296 元/ 月(有健保給付)	約 3750-18750 元/月	約 4980-5400 元/月	約 3944 元/月 (有健保給付)	約 6800-14800 元/月	約 4304 元/月 (有健保給付)	約 9500-12900 元/ 月
給藥 途徑	皮下注射		口服	皮下注射		皮下注射	皮下注射
給藥 頻率	每日施打一次		每日服用一次	每周施打一次		每周施打一次	每周施打一次
劑量	Victoza® 起始劑量：每次 0.6mg→ 1.2mg →1.8mg (使用一週後可慢慢上 調劑量)。 Saxenda® 由每次 0.6mg 逐漸調整至 3mg (間隔一周)。		3mg→7mg→14mg (同一劑量使用 30 天 後可慢慢上調劑量)	Ozempic® 起始劑量：0.25mg→ 0.5mg→1mg (最大劑量:每次 2mg)；(使用四週後可慢慢上調劑量) Wegovy® 由每次 0.25mg 逐漸調整 至每次 2.4mg(間隔四周)		起始劑量：0.75mg→ 1.5mg→3mg→4.5mg (最大劑量:每次 4.5mg) (使用四週後可慢慢調 整劑量)	起始劑量：2.5mg，以 每週 2.5mg 之增幅， 慢慢上調到目標劑 量。最大劑量:每次 15mg

忘記服藥怎麼辦？	✓ 可在每日任何時刻施打，若錯過當日劑量，只需在第二天照常服用下一劑即可。 ✓ 超過 3 天未施打，須從 0.6mg 開始施打(避免腸胃道副作用)。	忘記服藥請跳過，隔天空腹再服用下一次劑量，不能服用兩倍劑量。	如果錯過劑量，應在漏打後 5 天內盡快給藥。如果已超過 5 天，應跳過錯過的劑量並於原本排定的日期給予下一次劑量。	如果錯過劑量，應在漏打後 4 天內盡快給藥。如果已超過 4 天，應跳過錯過的劑量並於原本排定的日期給予下一次劑量。
如何更改給藥日	請每日按時服用	請每日按時服用	須至少與前一劑間隔 3 天	
其他注意事項		➤ 早晨空腹以約 120 毫升水服用 ➤ 服後至少 30 分鐘方可進食或服其他藥物，以免影響藥物吸收 ➤ 請整粒吞服 (剝半使用效果不佳)		