

馬偕醫院新型偏頭痛藥物比較表

2025/10/1

作用機轉	CGRP 受體小分子拮抗劑		CGRP 單株抗體		A 型肉毒桿菌神經毒素複合物
藥名	NURTEC 紐舒泰	AQUIPTA 艾妥達	EMGALITY 恩疼停	AJOVY 艾久維	BOTOX 保妥適
成分	rimegepant	atogepant	Galcanezu-mab	Fremanezu-mab	Onabotulinumtoxin A
效用	偏頭痛的急性治療、陣發性偏頭痛的預防性治療	偏頭痛預防	偏頭痛預防	偏頭痛預防	偏頭痛預防
用法	每日口服一劑	每日口服一劑	首次兩劑，其後每月一劑	每月一次一劑(慢性偏頭痛者首次須施打三劑)或每三個月一次三劑	每三個月 155-195 單位
途徑	口服	口服	皮下注射	皮下注射	肌肉注射
副作用	噁心	噁心、便秘	注射部位反應	注射部位反應	局部肌肉虛弱現象、注射部位反應
注意事項	如果發生過敏反應(包括呼吸困難和皮疹)，應停藥。	不建議使用於重度肝功能不全病人	如果發生過敏反應(包括呼吸困難和皮疹)，應停藥。	注射部位有發炎現象或目標肌肉太過虛弱或萎縮時，使用應謹慎。可能發生與注射相關的局部疼痛、發炎、感覺異常、感覺減退、觸痛、腫脹/水腫、紅斑、局部感染、出血和/或瘀血。針刺相關疼痛和/或焦慮會導致迷走神經反應，包括暫時性低血壓和昏厥	
健保給付條件	無-自費	無-自費	慢性偏頭痛之預防性治療： 1.需符合慢性偏頭痛診斷且經事前審查核准使用。 2.限神經內科或神經外科專科醫師診斷處方，並不得攜回注射。 3. CGRP(calcitonin gene-related peptide)單株抗體製劑僅能擇一使用且不得互換，並不得與 Botox 併用。	慢性偏頭痛之預防性治療： 1.需符合慢性偏頭痛診斷且經事前審查核准使用。 2.限神經內科或神經外科專科醫師診斷及注射。 3.不得與 CGRP(calcitonin gene-related peptide)單株抗體製劑併用	