

## 常見問題及回答

### (一) 胃造口處有滲漏情形

- 先檢查造口裝置是否太鬆或充水球水量不足。
- 確認造口裝置尺寸是否正確。
- 改變餵食的速度及食物型態。
- 使用保護皮膚隔離製劑，如氧化鋅、凡士林。

### (二) 胃造口處有肉芽增生情形

- 確實清洗胃造口周圍皮膚。
- 保持造口周圍皮膚乾燥。
- 就醫將增生肉芽剪掉並使用硝酸銀棒燒灼。
- 於肉芽處塗抹芳香精油，如茶樹精油。

#### \* 精油使用注意事項

- ◎ 建議勿單獨使用，須配合基底油（如甜杏仁油）。
- ◎ 使用前先皮膚測試：以1滴精油加10cc基底油混合後，抹在手腕內側停留24小時，觀察有否紅腫刺痛反應。
- ◎ 精油與基底油的比例

	1-6 歲 精油滴數	7-12 歲 精油滴數
5ml 基礎油	<3 滴	<5 滴
10ml 基礎油	<5 滴	<10 滴

### (三) 灌食常見之問題

#### ● 作嘔、嘔吐

- ◎ 常與原來疾病或手術有關。
- ◎ 併發於感冒、腸胃感染時。
- ◎ 管路不順：先確認管路是否位移情形，有時需要將管路往外拉，注意管路固定完整。

#### ● 腹脹

- ◎ 可能與原來疾病或手術有關。
- ◎ 對食物過敏，或食用易產氣食物如牛奶、豆類。可執行飲食日記，以瞭解對何種食材過敏。
- ◎ 食前檢查若有腹脹情形可先排氣，若造口裝置為鈕扣型，需連接長接頭之排氣管進行排氣。

#### ● 腹瀉

- ◎ 與進食的食物有關。
- ◎ 與服用之藥物有關，如抗生素。
- ◎ 腸道感染。
- ◎ 腸蠕動不正常。
- ◎ 傾倒症候群。

#### ● 便秘

- ◎ 與進食的食物有關。
- ◎ 長期臥床，腸蠕動不良。
- ◎ 可輔以軟便、利便藥物。嚴重者需定時灌腸。



## 諮詢管道

醫院網址：[www.mmh.org.tw](http://www.mmh.org.tw)

E - mail : [lisaliu@mmh.org.tw](mailto:lisaliu@mmh.org.tw)

[mmhss@ms2.mmh.org.tw](mailto:mmhss@ms2.mmh.org.tw)

聯絡電話：(02) 2543-3535轉2489社會服務室

(02) 2543-3535轉2168小兒外科門診

(02) 2543-3535轉2180小兒科衛教室

(02) 2543-3535轉2361新生兒病房

傳真電話：(02) 2521-8462社會服務室

聯絡地址：10449台北市中山區中山北路2段92號

小兒外科、小兒科 收

