

# Butaro® 全妥噴鼻液 Nasal Spray

(Butorphanol tartrate 10mg/ml)

鼻噴劑型 改變傳統止痛方式

**S** 使用簡單方便  
Simplicity

**O** 15分鐘止痛效果快  
Onset fast

**S** 止痛效果強  
Strong



Butaro衛教影片

## 全妥® 噴鼻液 10 毫克/毫升 Butaro® Nasal Spray 10mg/ml" LOTUS"

### 【成份】

每毫升含 Butorphanol tartrate 10 mg

### 【適應症】

使用鴉片類止痛劑的疼痛。

### 【禁忌】

BUTARO® NS 禁用於對 butorphanol 有高敏感性及對 BUTARO® NS 中所含防腐劑 benzethonium chloride 有高敏感性之患者。

### 【劑量與用法】

決定劑量時應考慮的因子包括年齡、體重、生理狀態、病理條件、藥物使用的條件、止痛藥的種類以及手術過程。對於高齡患者、腎病患者及肝病患者，使用時需要格外注意(參照警語 和臨床藥理學:劑量的個別化)。下列劑量是針對無肝腎疾病亦沒有使用中樞神經系統促進劑的患者。

### 疼痛治療：

一般建議初始劑量為 1 mg (單側鼻腔，一次) 以降低嗜睡及暈眩的發生。若是 60 - 90 分鐘內沒有充分得到疼痛緩解可以追加 1 mg。在第二次用藥之後視需要得以 3 - 4 小時為間隔 反覆使用。對於重度疼痛的處理，初始劑量 2 mg (單側鼻腔，一次) 得用於能夠維持躺臥的患者以防嗜睡或暈眩的發生。有些患者不能在 3 - 4 小時後給予追加劑量。

安全性與管理:由於 BUTARO® NS 為一開放式的運送系統故而增加其暴露於健康者的風險，在裝置的時候可能有部分洩出，所以噴霧器必須放置在遠離人或動物之處。

### 【警語】

#### 麻醉劑依賴患者：

由於鴉片類抗劑的性質，butorphanol 不被建議使用於具有麻醉劑依賴性的患者。這類的患者在開始 butorphanol 治療前必須有足夠的時間中斷鴉片類藥物之使用。Butorphanol 使長期攝取鴉片類止痛劑的患者出現戒斷症狀，如不安、焦慮、情緒多變、幻覺、煩躁、衰弱以及腹瀉。由於患者的對鴉片類製劑的耐受性很難判定，對此類最近曾反覆使用 麻藥性止痛用藥的患者，在投與 butorphanol 時應十分謹慎。

#### 藥物濫用與依賴：

藥物濫用— butorphanol 所有的使用方式都曾有過濫用的事件，經鼻腔使用的發生率較注射型的為多。生理性依賴、耐受性、藥物戒斷—長期持續使用 butorphanol，可能會產生生理性依賴或耐受性(對於投與劑量的反應度降低)。有生理性依賴的患者一旦突然停止使用可能導致戒斷症狀的發生。注意—適當選擇患者，劑量與限制，正確的使用方法，以及頻繁的監測，都是降低濫用與藥物依賴風險的要點。(參照藥物濫用與依賴)

